

DIFESA GUIDATA VITE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.9 DEL 10/06/2014

PERUGIA E TERNI

PERONOSPORA

Fase fenologica: Fioritura, Allegagione

In previsione di possibili piogge nel fine settimana si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , fluopicolide, fenilammidi, Fosetil AL ecc. associati a prodotti di copertura privilegiando il rame dove è avvenuta l'allegagione. Per un maggior dettaglio consultare il disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria presente nel relativo sito Internet.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE, Bupirimate, Quinoxifen, metrafenone, QOI Cyflufenamide ecc

Tignoletta (*Lobesia botrana*)

Fase decrescente del volo della prima generazione. Non si consigliano interventi

L' Ispettore fitosanitario

(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria

Servizio Politiche per l'innovazione e fitosanitarie

(Dr Sandro Marcugini)