

DIFESA GUIDATA VITE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.10 DEL 20/06/2014

PERUGIA E TERNI

PERONOSPORA

Fase fenologica: Allegagione , Ingrossamento acini.

In previsione di possibili ulteriori piogge a metà della prossima settimana si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fosetil AL ecc. associati a prodotti rameici o con prodotti caratterizzati da scarsa dilavabilità quali ametotradina , zoxamide ecc.. Per un maggior dettaglio consultare il disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria presente nel relativo sito Internet.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE, Bupirimate, Quinoxifen, metrafenone, QOI Cyflufenamide ecc

Tignoletta (*Lobesia botrana*)

Fase crescente del volo della 1 generazione carpo-faga . Eseguire campionamenti sui grappoli. Eventuali interventi al superamento della soglia consistente nel 10-15 % di grappoli con presenza di uova e /o larve.

I prodotti fitosanitari impiegabili sono riportati nel disciplinare di difesa integrata valido per l' anno 2014 presente sul sito della Regione Umbria

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Politiche per l'innovazione e fitosanitarie

(Dr Sandro Marcugini)