

DIFESA GUIDATA VITE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.11 DEL 02/07/2014

PERUGIA E TERNI

PERONOSPORA

Fase fenologica: Ingrossamento acini, Pre-chiusura grappoli

Stante l'incerto andamento climatico al fine di scongiurare attacchi di peronospora larvata si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), ecc. associati a prodotti rameici o con prodotti caratterizzati da scarsa dilavabilità quali ametotradina, zooxamide ecc.. Per un maggior dettaglio consultare il disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria presente nel relativo sito Internet.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE, Bupirimate, Quinoxifen, metrafenone, QOI Cyflufenamide ecc

Botrite

Su cultivars precoci a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Politiche per l'innovazione e fitosanitarie

(Dr Sandro Marcugini)

