

## DIFESA GUIDATA VITE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.12 DEL 11/07/2014  
PERUGIA E TERNI

### **PERONOSPORA**

Fase fenologica: Pre-chiusura grappoli-Chiusura grappoli

Stante l'incerto andamento climatico al fine di scongiurare attacchi di peronospora larvata si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali cymoxanil, CAA ( mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), ecc. associati a prodotti rameici o con prodotti caratterizzati da scarsa dilavabilità quali ametoctradina, zooxamide ecc.. Per un maggior dettaglio consultare il disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria presente nel relativo sito Internet.

### **OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE, Bupirimate, Quinoxifen, metrafenone, QOI Cyflufenamide ecc

### **Botrite**

Su cultivars precoci a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

### **Tignoletta della vite**

Si registrano ridotte catture nelle trappole installate

L' Ispettore fitosanitario  
( Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria  
Servizio Politiche per l'Innovazione e fitosanitarie

( Dr Sandro Marcugini)