

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.1 DEL 15/04/2015

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica :

Cv precoci (Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..) : lunghezza germogli 10cm, differenziazione grappolini

Cv tardive (Trebbiano ecc): lunghezza germogli 5cm

PERONOSPORA


Dove i germogli hanno raggiunto una lunghezza intorno ai 10 cm o più, in previsione di possibili piogge nel fine settimana si consiglia di intervenire con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) ,associati a prodotti di copertura.

Nel caso di eventuale comparsa di sintomi di peronospora avvisare tempestivamente il Servizio fitosanitario regionale ai seguenti Numeri telefonici: 075-5046261, 5046262.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)



Regione Umbria

Servizio Politiche per l'innovazione , la promozione e fitosanitarie

(Dr Giuliano Polenzani)

