

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.9 DEL 02/07/2015

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica :
pre-chiusura grappoli

PERONOSPORA

Presenza di peronospora nei testimoni ubicati a Allerona, Baschi, Montefalco.

In presenza di prolungate bagnature intervenire preferibilmente con prodotti rameici.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, cyflufenamide, IBE, metrafenone, quinoxifen, ecc

Tignoletta vite


Fase decrescente del volo della 1 generazione carpo-faga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve. I prodotti fitosanitari impiegabili sono riportati nel disciplinare di difesa integrata valido per l' anno 2015 presente sul sito della Regione Umbria

Botrite

Su cultivars precoci a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

L' Ispettore fitosanitario  (Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria

Servizio Politiche per l'innovazione , la promozione e fitosanitarie
( Dr Giuliano Polenzani)