

Fase fenologica : Allegagione e Accrescimento acini (BBCH 71-75)

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora nelle seguenti località: Montefalco, Bevagna, Torgiano (PG), Baschi (TR).

Possibili infezioni secondarie in presenza di prolungate bagnature .

Nell'eventualità intervenire con prodotti rameici nel caso di bassa pressione della malattia o altre s.a. quali ametoctradina, zooxamide in grado di assicurare una maggior copertura del grappolo in condizioni di maggior inoculo del micete.

OIDIO

Si consiglia di intervenire con zolfi bagnabili, Bupirimate, IBE , Metrafenone, Quinoxifen, Cyflufenamide, Spiroxamina ecc....assicurando una copertura continua in funzione della persistenza del prodotto fitosanitario oppure intervenire con zolfo in polvere

Marciume Nero o Black rot

Segnalata presenza di tale avversità . Nel caso privilegiare le s.a. riportate nel disciplinare di difesa integrata della vite valido per l'annata 2016-2017 pubblicato sul BUR e sul sito della Regione Umbria in data 07.06.2017.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Agr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Il Dirigente Vicario
Dr Francesco Grohmann