

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.4 DEL 16/05/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Grappoli separati, Pre-fioritura

PERONOSPORA

Probabile presenza di macchie di peronospora nella zona di Montefalco.
In previsione di possibili piogge a metà settimana si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura oppure le altre s.a. presenti nel disciplinare di difesa integrata (ametoctradina, amisulbrom, cyazofamide ecc).

OIDIO

Non rilevati sintomi nei testimoni non trattati
Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili,
meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc..

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)



Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Il Dirigente
(Dr Giuliano Polenzani)

