

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.5 DEL 23/05/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Pre-fioritura, Inizio Fioritura

PERONOSPORA

Assenza di sintomi nei testimoni di Fabbri a Montefalco, Torgiano e Alleroni (TR).

Probabile comparsa di sintomi in questa settimana per supposte infezioni primarie del 12 e 15 maggio.

Si consiglia, comunque, in considerazione della fase fenologica raggiunta di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura oppure le altre s.a. presenti nel disciplinare di difesa integrata (ametoctadina, amisulbrom, cyazofamide ecc).

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc..

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Il Dirigente
(Dr Giuliano Polenzani)