

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.7 DEL 09/06/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Fine Fioritura, Allegagione

PERONOSPORA

Stante l'incerto andamento climatico si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, ametoctradina, amisulbrom, cyazofamide ecc... privilegiando il rame come partner dove è avvenuta l'allegagione al fine di scongiurare manifestazioni di peronospora larvata su grappolo.

Si informa che il disciplinare difesa integrata vite per l'anno 2015-2016 è stato pubblicato sul Suppl. ordinario n. 8 al BUR n. 26 del 01.06.2016 e risulta reperibile sul sito della Regione Umbria:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, spiroxamina, IBE , Quinoxifen, Cyflufenamide , Bupirimate, ecc..

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Il Dirigente
(Dr Giuliano Polenzani)

Bo07\2016