

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.13 DEL 11/08/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Invaiaitura, Inizio maturazione

PERONOSPORA

Non si consigliano interventi salvo per impianti giovani in allevamento dove si interverrà in presenza di prolungate bagnature e sintomi di peronospora con prodotti rameici (limite massimo di impiego 6 Kg annui di s.a. ad ha).

OIDIO

Non si consigliano interventi.

Tignoletta vite

Fase crescente del volo della 2 generazione carpo-faga.


Eventuali interventi potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve con le s.a. riportate nel disciplinare di difesa integrata vite per l'anno 2015-2016 reperibile sul sito della Regione Umbria:


www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata

Si precisa che non potranno essere utilizzate per l'eventuale controllo della tignoletta le s.a. Clorpirifos-metile e Clorpirifos -etile per problemi ecotossicologici (DD Regione Umbria N. 7313 del 05.08.2016 in corso di pubblicazione sul BUR).

Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e fitosanitario

L' Ispettore fitosanitario
(Dr  Natalini)

Il Dirigente
( Giuliano Polenzani)